


دليل العناية بأنواع النباتات المنزلية

الحرارة:	الإضاءة:
يحتاج إلى درجات حرارة عالية (دافئة)	نباتات تتطلب كثيرا من ضوء الشمس (الجهة الجنوبية من المنزل)
يحتاج إلى درجات حرارة متوسطة (معتدلة)	نباتات تتطلب كثير من الضوء ولكن يجب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة بين الساعة العاشرة صباحا والخامسة بعد الظهر (الشرق أو الغرب من المنزل)
يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة (باردة)	نباتات يمكن أن تعيش على ضوء أقل (جهة الشمال من المنزل)
من الممكن أن تكون هذه النبتة مضرّة إذا أكلت.	الرطوبة:
❄️	حافظ على رطوبتها ولا تتركها تجف.
	حافظ على التربة رطبة إلى حدّها وأنها تجف قليلا قبل سقي النبات في المرة التالية.
	حافظ على التربة جافة إلى حد ما. ويسقى النبات كمية قليلة من الماء فقط عندما تكون في حاجة إلى ذلك.

	الجو الملانم				التكاثر	الموطن الأصلي	العائلة	إسم النبتة	
	مضرة	الإضائة	الحرارة	الرطوبة					
					تحتاج إلى ضوء وحرارة ورطوبة متوسطة وتربة جيدة ورطوبة باستمرار.	العقلة الساقية والظرفية في الخريف	غرب الباسفيك	Euphorbiaceae	أكاليفا Acalypha sp
					تتمو في ضوء الشمس والأماكن النصف ظليلة وتحتاج إلى حرارة متوسطة وكذلك لرطوبة متوسطة أيضا.	تتكاثر الأكميا بالخلفات النامية بجانب الأمهات، وعندما تصل الأمهات إلى الحجم المناسب من النمو فإنها تخرج خلفات وهذه يمكن زراعتها مستقلة لوحدها.	البرازيل	البروميلية	أكميا فاسيتا Aechmea fasciata

				ينمو في ضوء الشمس والنصف ظل، ويحتاج إلى حرارة متوسطة ورطوبة ٣٠% فأكثر ويزرع في تربة غنية بالدبال.	العقلة الطرفية في الربيع وأول الصيف		القلقاسية Araceae	أجلونما Aglaonema sp	
					تربة خفيفة غنية بالمواد الغذائية التي تعيش في الأماكن المظلة والحرارة ورطوبة أكثر من ٥٠%	الخلفات بجوار الأم	كوستاريكا	القلقاسية Araceae	أنثوريم Anthurium scherzerianum
				تحتاج إلى الضوء وحرارة متوسطة وتسميد خلال فترة النمو وكما أنها تتأثر بإستعمال المبيدات الحشرية.	تتكاثر بالعقل الطرفية في الربيع.	البرازيل	الأكانثية	أفلندرا سكاروزا Aphelandra squarrosa	
				تحتاج إلى رطوبة غزيرة أثناء فترة النمو، ودرجة حرارة معتدلة في الشتاء وتسميد متوسط	تتكاثر الأوركايا بالبذرة والعقلة	جزر تورفولك في المحيط الهادي	الأبتية	أوركايا هيتروفيللا Araucaria heterophylla (A. excels)	

				يحتاج إلى جو دافئ خلال فترة النمو ورطوبة عالية ويسمد بالاسمدة المركبة	يتكاثر بالبذرة في الربيع ويفضل نقع بذور الأسبرجس بالماء لمدة ٢٤ ساعة قبل الزراعة. كما يتكاثر أيضا بالتقسيم في الربيع ويحتاج إلى تربة خفيفة خصبة	جنوب إفريقيا وأواسطها	النجسية Lillaceae	اسبرجس Asparagus sp
				يحتاج إلى كمية وافرة من الرطوبة الأرضية وأنسب درجة حرارة هي 65°ف وتحتاج تربة جيدة الصرف والرطوبة	تقسيم الريزومات الأرضية	الصين واليابان والهملايا	Eiliaceae	أسبيدسترا Aspidistra elatior (A. luride)
				تحتاج إلى جو دافئ وتربة رطبة خلال فترة النمو وفي الشتاء رطوبة أقل وحرارة معتدلة.	تتكاثر بالبلايل وهي نتوات، ويخرج من هذه البلايل أوراق صغيرة وهي لاتوال متصلة بالأم	آسيا، وشرقي إفريقيا ونيوزيلندا	الأسبيلينية	أسبيلينيم نيدوس Asplenium nidus
				تحتاج إلى ضوء ساطع كما يجب أن تكون التربة رطبة باستمرار.	تتكاثر بالعتل في أواخر الشتاء وأوائل الربيع، حيث يزرع في وسط الرمل والبيتموس	اليابان والصين	الأريكاسية	الأزاليا Azalea sp
				ينمو في جو ظل ونصف ظل والأماكن الدافئة ورطوبة ٣٠% فأكثر وتربة غنية بالمواد الغذائية.	الدرنات في الربيع	البرازيل	Araceae	كلاديوم Caladium hybrida

				ينجح في الأماكن نصف ظل، وحرارة متوسطة ورطوبة ٥٠% فأكثر وتربة غنية بالمواد الغذائية	بتقسيم الجذور في الربيع	البرازيل	Marantaceae	كالاثيا Calathea sp	
				تنمو في ضوء الشمس أو نصف الظل والظل، وتحتاج إلى حرارة ورطوبة متوسطة وتنمو في تربة جيدة من الرمل والطيني.	العقدة، والبلايل التي تتكون على طول الساق	-	Asclepaidaceae	سيروبجيا Ceropegia sp	
				تحتاج إلى رطوبة مستمرة وحرارة 65°ف وتربة جيدة الصرف	التقسيم، البلايل، البذرو بمجرد نضجها.	وسط أوروبا وجبال الألب	الزنبقية	فلانجم Chlorophytum sp	
					تنمو في الظل الخفيف والجو المعتدل الحرارة والري المتوسط، وكما يجب ملاحظة النمو الخضري وتقلل التزهير	تتكاثر بالحلقات في الخريف وكما يمكن إكثارها بالبذرة في الربيع	جنوب إفريقيا	الأمرليدية Amaryllidaceae	كليفا مينياتا Clivia miniata
					تحتاج غلى ضوء ساطع وجو دافئ ورطوبة عالية أي في الشتاء تحتاج إلى ري معتدل لأنها تكون بفترة السكون.	تتكاثر بالعقل الغضة والناضجة أو بالترقيد	آسيا الإستوائية	السوسيه	كروتين Codiaeum variegatum

				تحتاج إلى ضوء ساطع وكاف إظهار ألوان الأوراق الجميلة وكما أنها تحتاج إلى رطوبة كافية لتكوين الجذور والتسميد الأزوتي لزيادة نموها الخضري. كما يجب تطويز، أي قص الأفرع بعد أن يبلغ النبات ١٥ سم وذلك لتشجيع النموات الجانبية وإنتاج نباتات كثيفة.	تتكاثر بالعقلة الطرفية في الربيع والخريف ويمكن الحصول على أصناف جيدة بواسطة زراعة البذرة، وكما يمكن وضع العقل في الماء إلى أن تتكون لها جذور ثم تغرس في البيتموس	آسيا الإستوائية	الشفوية	الكوليوس (السجاد) Coleus Blumei Hybr
				تنمو في الأماكن المضيئة والنصف ظل وتحتاج إلى حرارة متوسطة ورطوبة أكثر من ٥٠%، مع الاحتفاظ برطوبة البيئة.	العقلة الطرفية، البذور في بيئة دافئة ومرترعة الرطوبة	أميركا الإستوائية	Gesneriaceae	كولمنيا Columnea sp
				ينمو في الأماكن المظلمة والمتوسطة الإضاءة ويحتاج إلى حرارة ورطوبة متوسطة، وترش الأوراق باستمرار، ويحتاج إلى تربة جيدة.	الخلفات	البرازيل	Bromeliaceae	كريبتانثس Cryptanthus sp
				ينمو في أماكن نصف ظل والمتوسطة الإضاءة، وتحتاج حرارة منخفضة لالتزيد عن 72°ف في الشتاء ورطوبة ٥٠% فأكثر مع وجود هواء متجدد.	باليدور التي تزهو بعد ١٨ شهر	سوريا	الربيعية Primulaceae	سيكلامن Cyclamen sp

					تحتاج إلى جو حار ومعتدل رطب وضوء ساطع، وكما أن الظل الكثير يسبب إفتقار اللون الطبيعي للنبتة والرطوبة الزائدة عن الحاجة تسبب غرق الجذور وتعفننها.	تتكاثر بالعقلة أو الخلفات النامية بجانب الامهات، وبالنسبة للعقلة فتؤخذ العلقمة من السوق اللحمية حيث تحتوي على أكثر من برعم ثم تغرس هذه العلقمة في أصيص أو أحواض قد جهزت جيدا بالبيتموس والرمل، حيث توضع أفقيا إلى أن تتكون لها جذور ثم تنقل إلى أصص أخرى مناسبة للتربية.	كولومبيا وكوستاريكا	القلقاسية Araceae	ديفنباخيا أميونا Dieffenbachia amoena
					تحتاج إلى جو دافئ وظل خفيف وري غزير خلال فترة النمو.	بالعقلة أو الخلفات	أمريكا الجنوبية	القلقاسية Araceae	ديفنباخيا مرقشة Diffenbachia seguine
					تحتاج إلى ضوء ساطع ورطوبة كثيرة أثناء فترة النمو في الصيف والربيع ورطوبة متوسطة أثناء السكون في الشتاء.	تتكاثر بالعقل من سوق ناضجة	المناطق الإستوائية	الأجافية	دراسينا Dracaena
					يحتاج إلى ضوء ونصف ظل ويحتاج إلى حرارة منخفضة ورطوبة ٣٠% فأكثر، ويحتاج إلى تربة جيدة رطبة.	العلقمة نصف ناضجة في الخريف والشتاء	اليابان	Celastraccae	أيونمس Euonymus japonicus hybr

					تحتاج إلى الضوء الساطع والجو الدافئ والمعتدل كما تحتاج إلى رطوبة خفيفة لأن كثرة تسبب تعفن الجذور.	تتكاثر بالعقلة	المكسيك والمناطق الإستوائية في أمريكا الجنوبية	السوسبية	أبوفوريبا بولخريما (بنت القنصل) Euphorbia pulcherrima
					تحتاج إلى ضوء ساطع وجو دافئ ورطوبة مستمرة ماعدا في الشتاء تكون الرطوبة قليلة	تتكاثر بالعقلة	أفريقيا، مدغشقر وجزر الكناري	السوسبية	إبوفوريبا شمعدان Euphorbia trigona
					ينمو في الأماكن المظلمة والمتوسطة الإضاءة، ويحتاج إلى حرارة متوسطة ورطوبة ٣٠% فأكثر. وتربة جيدة (طمي + رمال + دبال) مع المحافظة على الرطوبة.	الترقيد الهوائي، العقلة الساقية.		Moraceae	فيكس Ficus sp
					تحتاج إلى مكان متوسط الضوء أو ظل ومتوسط الحرارة ورطوبة ٣٠%.	العقلة الطرفية	بيرو	A Canthaceae	فيتونيا Fittonia sp
					تحتاج لضوء قوي وكذلك لرطوبة كافية، كما يجب رش الأوراق بالماء باستمرار.	بالعقد الطرفية.	الصين واليابان	Rubiaceae	الجاردينيا Gardenia jasminoides









				ينمو في الظل الخفيف والحرارة الدافئة والرطوبة المعتدلة.	بالخلفات النامية بجاني الامهات	أمريكا الوسطى	البروميلية	جوز مانيا مانور Guzmania minor (Orange)	
					ينمو في ضوء الشمس إلى الأماكن الظليلة ويحتاج إلى حرارة منخفضة 0ف في الشتاء وإلى رطوبة متوسطة مادامت الظروف الأخرى مناسبة ويفضل ٣٠% أو أكثر. ومخلوط التربة يكون من أجزاء متساوية من الرمل والطمي والدبال.	العقلة والترقيد في الأرض في أي وقت من السنة.		Araliaceae	هيدرا (حبل المساكين) Hedera sp
				يجود زراعته في التربة الصفراء الجيدة ويفضل بقاء الأنبصال مكانها للعام القادم لإنتاج أزهار مبكرة والإعتدال بالري.	بالأبصال أو بالبذرة لإنتاج أصناف جديدة.	أفريقيا الإستوائية	Amaryllidaceae	الأمريلس Amaryllis Hippeastrum vittatum	
				تحتاج لضوء ساطع وجو دافئ ورطوبة معتدلة.	بالبذرة والخلفات	جزر هاواي	النخيلية Palmaceae	كنتيا (Kentia) Howea forsteriana	

					ينمو في جو مشمس ونصف ظل، ويحتاج إلى حرارة ورطوبة متوسطة ويحتاج إلى تربة خفيفة غنية بالمواد الغذائية	العقلة الطرفية في الربيع، والترقيد في أي وقت		Asclepiadaceae	هويا Hoya carnosa
					تحتاج إلى الضوء العادي أو المتوسط، وحرارة منخفضة ورطوبة ٣٠% أو أكثر ويلزم الاحتفاظ بالتربة رطبة.	البذرة والعقلة في أي وقت من أوقات السنة.	جزيرة مدغشقر	Acanthaceae	هيبوستس Hypoestes taeniata
					تحتاج إلى جو معتدل من ١٨-٢٥ درجة مئوية والري المناسب كلما جفت الأرض، حتى لا تتعفن الأصيل، ويحتاج إلى شمس لحسن الأزهار. ويحتاج إلى تربة خفيفة حتى لا تصاب الأصيل بالعفن.	بالأصيل الموجودة تحت سطح التربة أو بالبذرة.	نصف الكرة الشمالي	Liliaceae	الليليم Lilium sp
					تنمو المارنتا في الأماكن النصف وتحتاج حرارة ورطوبة متوسطة.	تتكاثر المارنتا بالتقسيم في فصل الربيع	شرقي البرازيل	المارنتية	مارنتا Maranta leuconeura

				يحتاج إلى حرارة ورطوبة متوسطة وتربة جيدة (رمل، طمي ودبال) على أن تكون التربة رطبة باستمرار.	العقلة الساقية، العقدة وهي متصلة بالورقة والخلفات.	Araceae	القلقاسية	مونسترا (القشطة الهندية) Monstera sp
				ينمو في الظل والظل الخفيف، ويحتاج للري الغزير.	بالخلفات حيث يتم تقسيمها وزرعتها.	المناطق الإستوائية	الأولياندرية	نفرولبس أكرالتاتا (فو جير رومي) Nephrolepis exaltata
				يحتاج إلى جو معتدل ويحتاج إلى شمس لحسن شكل الأزهار وإكمال النضج والتربة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية.	العقلة الطرفية في الربيع.	جنوب إفريقيا	Geraniaceae	الخبيزة الإفريقي Pelargonium zonale-hybr
				تنمو في الظل الخفيف وتحتج لجو دافئ ورطوبة مستمرة.	بالعقلة الساقية أو الورقية.	المنطقة الإستوائية الممطرة في أمريكا الجنوبية.		بيروميا بيضاء Peperomia obtusifolia (Variegata)
				يحتاج إلى جو معتدل الحرارة ويحتاج إلى شمس للأزهار الكامل والري المناسب حتى تبقى التربة خفيفة.	بالبذرة للمفرد – والمجوز بالعقلة الطرفية.	جنوب البرازيل وفي الأرجنتين	البازنجانية Solanaceae	بتونيا Petunia hybrida

					ينمو في الاماكن خفيفة الظل ويحتاج لجو معتدل ودافئ، ورطوبة مستمرة.	بالعقل الطرفية أو الساقية.	أمريكا (الإستوائية)	القلقاسية Araceae	فيلوديندرم ايمرد كوين Philodendron erubescens (Emerald Queen)
					ينمو في الظل والظل الخفيف ويحتاج لجو دافئ معتدل، ورطوبة مستمرة.	بالعقل الطرفية من نموات جديدة.	الأنتيل	القلقاسية Araceae	فيلوديندرن سكاندنز- متسلق - Philodendron scandens
					ينمو في الاماكن المتوسطة الإضاءة إلى نصف الظليلة ويحتاج إلى حرارة ورطوبة متوسطة ويفضل ٣٠% أو أكثر مع وفرة التهوية وتزرع في تربة جيدة.	بالعقلة		Irticeae	Pilea sp بيليا
					تحتاج إلى الضوء الساطع وكما يمكن زراعتها في الظل الخفيف ورطوبة متوسطة.	تتكاثر بالخلفات أو بتقسيم الورقة.	إفريقيا الإستوائية	الزنبقية	سنسفيرا Sansaeviera trifasciata

				ينمو في الأماكن المتوسطة الإضاءة والأماكن نصف الظل وتحتاج إلى حرارة منخفضة عن 72°ف في الشتاء ورطوبة 30% فأكثر والتربة جيدة ورطبة.	بالباتات الصغيرة التي تتكون في أطراف السوق المدادة الحمراء الناصعة.	الصين واليابان	Saxifragaceae	ساكسفراجا Saxifraga stolonifera
				يحتاج إلى ضوء ساطع وظل خفيف وجو بارد ومعتدل، والرري بانتظام ويترك ليجف من وقت لآخر.	تتكاثر بالعقل الساقية النصف ناضجة.	استراليا وجاوا	الأرالية Araliaceae	شيفليرا أكتينوفيللا Shefflera actinophylla
				ينمو في الضوء الساطع والخفيف ويحتاج إلى جو دافئ ورطوبة كثيرة. وأن تكون التربة جيدة غنية بالعناصر الغذائية.	العقلة الطرفية.	جزر سليمان الملايو	القفاسية Araceae	سندابسس (بوتس) Scindapsus sp (pothos)
				نبات عديم الساق أو قصيرة تشبه الكلا في الأزهار تنمو في الأماكن الظليلة أو النصف ظليلة وحرارة متوسطة ورطوبة 30% أو أكثر.	تقسيم الجذور السميقة لنبات الأم في الربيع.	—	Apocynaceae	سباتيفللم Spathiphyllum wallisii
				يحتاج لرطوبة كبيرة وجو معتدل إلى بارد	بالعقلة في أي وقت	أمريكا الوسطى	الكوملينية	تراد سكانيتا (اليهودي الزاحف) Tradescantia (Rochfords Silver)

				يحتاج إلى جو ساطع ورطوبة معتدلة.	بالعقلة	شرق أمريكا والمكسيك	الزنبقية	يوكا اليوفوليا Yucca aloifolia
				تحتاج إلى شمس وحرارة متوسطة ورطوبة ٣٠% فأكثر وتزرع في تربة غنية بالدبال.	الريزومات في الصيف والخريف للبيضاء، الشتاء والربيع للألوان. والبذور	جنوب أفريقيا	القلقاسية Araceae	الكلا Zantedeschia sp